



SKETCH
HOIKUEN

発行日令和5年2月1日
スケッチ保育園 吉田

気温が低く乾燥した日が続いています。寒いからといって窓を閉め切っていませんか？長い時間換気をしない室内はウイルスや二酸化炭素、ほこりで汚れてしまいます。寒くてもこまめに換気を行い、空気の入れ替えを心掛けましょう。

県内でも感染性胃腸炎が流行してきています。感染性胃腸炎は、数時間前まで元気だったのに突然顔色が変わり嘔吐がはじまるケースが多くみられます。症状が重いときは、水分を与えても吐いてしまいます。様子をみながら少しずつ水分を与え、脱水予防につとめましょう。下痢の症状は、数日前から出る場合もあります。嘔吐物や便から感染するケースが多いので、早めの処理と消毒が感染予防につながります。感染後の登園基準は、吐き気止め・下痢止めの薬を飲んでいない状態で、嘔吐・下痢などの症状が完全に治まり普段通りの食事がとれ機嫌がよいことです。事前に保育園へ連絡をして登園の目安をご確認ください。

吐いた！

しっかり消毒、ゴミは
密封して捨てましょう

※塩素系漂白剤で消毒した場合、

衣類も漂白されることがあります。

お子さまのそばでは塩素系漂白剤を

使用しないでください。

ウイルスは便の中に1カ月ぐらい出続けるので注意が必要です

1 処理に必要なものを準備する

まず、換気します。消毒液やペーパータオル、布や雑巾（捨てられるもの）を用意し、使い捨ての手袋やマスクをつけます。

消毒液の作り方

家庭用塩素系消毒薬



×4

6%の原液の場合、
ペットボトルの
キャップ4杯



水 1L

2 外から中心に 向かってふき取る

吐いたものはペーパータオルなどで外から内側に向かってふき取り、ゴミはポリ袋に二重に密封して捨てます。

汚れた衣類は……

汚れを取り除いて消毒液につけておきましょう。



3 消毒した後、 水ぶきする

吐いたもので汚れたところを、消毒液を浸した布で外側から中心に向かってふき取ります。その後、水ぶきで消毒薬もふき取ります。

4 よく手を洗う

使い捨ての手袋やマスクもポリ袋に密封して捨て、手をよく洗いましょう。

全国的にインフルエンザの罹患率があがってきているようです。コロナウイルスとの同時感染もみられています。インフルエンザに感染した場合の登園基準は発症した後5日を経過し、かつ解熱した後乳幼児にあたっては3日を経過するまでとなっております。（必ず両方にあてはまっていること）

登園の際は、登園許可届を提出していただきます。その他の留意点としてはインフルエンザ検査で陰性（-）であっても、インフルエンザ治療薬を服用または吸入した場合はインフルエンザ罹患扱いとなり、出席停止となります。また兄弟で罹患者がいる場合は感染するリスクが高いため、可能な場合は一緒にお休みのご協力をお願い致します。